

Magnefar B6 Forte 60tabl. \$



cena: 22,13 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,1g jonów Mg ²⁺⁺ +10,1mg
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Magnesii citras, Pyridoxini hydrochloridum

Opis produktu

Wskazania:

Produkt leczniczy jest zalecany w leczeniu niedoboru magnezu.

Działanie:

Niedobór magnezu objawia się:

nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu;

objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);

skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: cytrynian magnezu (Magnesii citras) oraz witamina B6, czyli chlorowodorek pirydoksyny (Pyridoxini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.

1 tabletkę powlekaną zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu i 10,10 mg witaminy B6.

Dawkowanie:

Dorośli. 3-4 tabl./dobę, w 2-3 dawkach podzielonych.

Wiek 6-14 lat: mc. 21-30 kg.: 1-2 tabl./dobę, w 2-3 dawkach podzielonych;

Wiek 6-14 lat: mc. 31-39 kg: 2-3 tabl./dobę, w 2-3 dawkach podzielonych.

Wiek 14-18 lat: mc. ≥40 kg: 3-4 tabl./dobę, w 2-3 dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania:

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek