

Maxicortan krem 0,01g/g 15g \$



cena: 11,03 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	15 g
Postać	krem
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Hydrocortisonum

Opis produktu

Wskazania:

Produkt leczniczy stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Produkt leczniczy stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach: atopowe zapalenie skóry; wyprysk kontaktowy alergiczny, pokrzywka; reakcje występujące po użądleniu lub ukąszeniu przez owady (jak swędzenie i podrażnienie).

Działanie:

Przeciwzapalne, przeciwświądowe i obkurczające naczynia krwionośne.

Skład:

1g kremu zawiera: 10mg hydrokortyzonu octanu.

substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikolol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, makrogolu eter cetostearylowy, parafina ciekła, sorbitanu stearynian, wazelina biała, woda oczyszczona.

Sposób użycia:

Stosować 2 razy na dobę, miejscowo na zmienione chorobowo miejsce. Preparat można stosować do 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na octan hydrokortyzonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Trądzik zwykły. Trądzik różowaty. Atrofia (zanik) skóry. Nowotwory i stany przednowotworowe skóry. Dermatitis perioralis. Zmiany gruzlicze skóry. Otwarte rany i uszkodzona skóra. Współistniejąca grzybica układowa. Skóra twarzy. Dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Interakcje:

Nie opisywano dotychczas interakcji z zewnętrznym podawanym octanem hydrokortyzonu.

Działania niepożądane:

W razie długotrwałego stosowania produktu leczniczego (przez okres dłuższy niż 14 dni), mogą wystąpić działania niepożądane. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zanikowe zapalenie skóry, zapalenie mieszków włosowych, alergia kontaktowa, zapalenie okołooczne (dermatitis periorbicularis), nadmierne owłosienie, opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń, wybroczyny, rozstępy, plamica posteroidea (przebarwienia i odbarwienia skóry), trądzik posteroidea, dermatitis perioralis, pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe, wtórne zakażenia. Zaburzenia naczyniowe: powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych, wybroczyny. Zaburzenia oka: jaskra lub zaćma. Możliwe jest wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych octanu hydrokortyzonu charakterystycznych dla glikokortykosteroidów. Występują one przede wszystkim w przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego, stosowania go na dużą powierzchnię skóry, pod opatrunkiem okluzyjnym lub w przypadku stosowania u dzieci. Ogólnoustrojowe objawy niepożądane octanu hydrokortyzonu charakterystyczne dla kortykosteroidów, to m.in. zahamowanie czynności osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, zespół Cushinga, hamowanie wzrostu i rozwoju u dzieci, hiperglikemia, cukromocz.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą

zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.