

Nizoral szamp.leczn. 0,02g/g 6sasz.



cena: 21,42 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	6 sasz.a 6ml
Postać	szamp.leczn.
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	
Substancja czynna	Ketoconazolum

Opis produktu

Wskazania:

Przeznaczony do leczenia i profilaktyki w chorobach skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (wcześniej nazywane *Pityrosporum*) takich jak:

- łupież owłosionej skóry głowy,
- łojotokowe zapalenia skóry,
- łupież pstry (wywołanego przez *Pityriasis versicolor*).

Działanie:

Przeciwgrzybicze.

Sposób użycia:

Do stosowania miejscowego na skórę. Produkt leczniczy stosuje się u młodzieży (>12 lat) oraz osób dorosłych. Zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub owłosioną skórę głowy należy

umyć produktem. Produkt w postaci szamponu leczniczego i pozostawić go na skórze przez 3-5 min, a następnie spłukać. Zazwyczaj 1 saszetka lub garść szamponu wystarcza do jednorazowego zastosowania.

- Łupież pstry: stosować raz/dobę przez 1 dzień.
- Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować 2x/tydz przez 2-4 tyg.
- Profilaktyka: Łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: stosować raz/tydz. lub raz/2 tyg.

Skład:

1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurilosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makrogolu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Działania niepożądane:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): rumień, podrażnienie, świąd, odczyn i krosty, podrażnienie oka, zwiększone wydzielanie łez, zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa struktura włosa, wysypka, uczucie pieczenia, łuszczenie naskórka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): pokrzywka, zmiana barwy włosów, obrzęk naczynioruchowy.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.