

Paracetamol zaw. Hasco 150g



cena: 15,78 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,12 g/5ml
Opakowanie	150 g (butelka)
Postać	zaw.doust.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Wskazania:

Preparat stosuje się w gorączce i bólach różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu) oraz dolegliwościach towarzyszących reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy). Ponadto lek stosuje się u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Działanie:

Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo.

Sposób użycia:

- od 0-3 miesiąca życia 2,5-10 ml
- od 4-8 miesiąca życia 4-16ml
- od 9-11 miesiąca życia 5-20ml

- od 1-2 lat 6,5- 26ml
- od 2-3 lat 8-32ml
- od 4-5 lat 12-48ml
- od 6-8 lat 15-60ml
- od 9-10 lat 20-80ml
- od 11-12 lat 28,5-114ml

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez lekarza.

Do opakowania dołączona jest miarka lub łyżka miarowa lub korek i strzykawka doustna.

Skład:

Substancją czynną leku jest paracetamol: 5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoesian (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) powiększenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) wymioty, biegunka.