

## Pedicetamol rozt.doust. 0,1g/ml 30ml



cena: 14,20 PLN

### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,1 g/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	rozt.doust.
Producent	SEQUOIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamolum

### Opis produktu

#### **Wskazania:**

Leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

#### **Działanie:**

Przeciwbólowo, przeciwgorączkowo.

#### **Sposób użycia:**

Dawka zależna jest od masy ciała dziecka.

Zwykle stosuje się ok. 60 mg/kg masy ciała na dobę i dawka jest podawana 4-6 razy na dobę:

- 15 mg na kg masy ciała co 6 godzin, (to znaczy  $0,15 \times$  masa ciała = ilość leku Pedicetamol w ml, np.:  $10 \text{ kg} \times 0,15 = 1,5 \text{ ml}$ )
- 10 mg na kg masy ciała co 4 godziny, (to znaczy  $0,1 \times$  masa ciała = ilość leku Pedicetamol w ml, np.:  $10 \text{ kg} \times 0,1 = 1 \text{ ml}$ )

### **Skład:**

Substancją czynną jest: paracetamol (Paracetamolum).

1 ml (25 kropli) zawiera 100 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylovowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmioizyna) (E122) i woda oczyszczona.

### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

### **Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

### **Działania niepożądane:**

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) powiększenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) wymioty, biegunka.