

## Pirolam lak.do pazn.lecz. 0,08g/g 4g

cena: 56,23 PLN



### Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,08 g/g
Opakowanie	4 g
Postać	lak.do pazn.lecz.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	
Substancja czynna	Ciclopiroxum

### Opis produktu

#### **Wskazania:**

Grzybicze zakażenia paznokci. Produkt jest przeznaczony do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia maksymalnie 4 z 10 paznokci.

#### **Działanie:**

Przeciwgrzybicze.

#### **Skład:**

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. Każdy gram lakieru zawiera substancję czynną 80mg cyklopiroksu. Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem monobutylovym kwasu 2-butenodiowego.

#### **Sposób użycia:**

Zalecane dawkowanie zmienia się z czasem stosowania leku. Leczenie można podzielić na

kilka etapów:

1. Pierwszy miesiąc: lakier nakładać co drugi dzień na chorobowo zmieniony paznokieć – etap nasycenia paznokcia cyklopirokssem.
2. Drugi miesiąc: nakładanie lakieru można ograniczyć do 2 razy w tygodniu.
3. Trzeci miesiąc: stosować raz w tygodniu.

Przez cały okres leczenia należy:

- raz w tygodniu zmyć lakier za pomocą zmywacza kosmetycznego. Ma to na celu zapewnienie prawidłowe wnikanie substancji czynnej w płytkę paznokcia.
- przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru spiłować płytkę jednorazowym pilnikiem, który następnie wyrzucić.

Jeśli warstwa lakieru została uszkodzona należy ją uzupełnić w ubytkach.

Sposób stosowania: Ręce lub stopy umyć wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Przy użyciu jednorazowego pilnika delikatnie spiłować wierzchnią warstwę płytki paznokcia, tak aby usunąć jak najwięcej chorej części. Pilnik wyrzucić. Płytkę przetrzeć wacikiem nasączonym preparatem dezynfekującym. Nanieść równomiernie lakier na chorobowo zmienioną płytkę paznokcia.

### **Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych klinicznych.

### **Działania niepożądane:**

U nielicznych chorych obserwowano miejscowe podrażnienie (pieczenie, świąd, rumień, obrzęk, zaczerwienienie i łuszczenie) po kontakcie produktu leczniczego w postaci lakieru zawierającego w swoim składzie cyklopiroks ze skórą otaczającą paznokieć.