

Posterisan czopki 10szt. 1op.

cena: 34,49 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,3871 g
Opakowanie	10 czop.
Postać	czop.doodbyt.
Producent	DR KADE PHARMAZEUT.FABRIK GMBH
Rejestracja	
Substancja czynna	Escherichia coli

Opis produktu

Wskazania:

Lek jest wskazany do stosowania w swiędzeniu, sączeniu i pieczeniu w okolicy odbytu spowodowanym guzkami krwawniczymi.

Działanie:

Pobudzenie układu immunologicznego organizmu i wsparcie naturalnej reakcji obronnej na zakażenia. W konsekwencji lek uśmierzenia swięd i pieczenie.

Sposób użycia:

Zazwyczaj stosowane dawkowanie to czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy.

Skład:

Substancją czynną leku jest 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu). W skład zawiesiny wchodzi składniki

komórkowe i produkty przemiany materii z 660 min bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem.

Substancje pomocnicze: tłuszcz stały, makrogoglycerolu hydroksystearynian.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach występowania nadwrażliwości, wystąpić mogą skórne reakcje uczuleniowe (przykładowo na środek konserwujący fenol).