


Raphacholin C 30draż.#

cena: 14,87 PLN



Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	-
Opakowanie	30 tabl. (blister)
Postać	tabl.drażow.
Producent	WROCLAWSKIE ZAKLADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Produkt złożony

Opis produktu

Wskazania:

Lek stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z nieprawidłową czynnością wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Działanie:

Działa żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie i zwiększa ilość wydzielanej żółci). Regularne przyjmowanie produktu pobudza wydzielanie żółci, co działa ochronnie na miąższ wątroby i przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji. Regularne wydzielanie żółci wzmacnia ruchy perystaltyczne jelit.

Sposób użycia:

Dorośli:

- w niestrawności: jednorazowo 1-3 tabletki,

- w innych dolegliwościach trawiennych: przeciętnie 1-2 tabletki 3 razy dziennie, 30 minut po posiłku,
- w zaparciach: 2 tabletki rano i wieczorem 30 minut przed jedzeniem.

Dzieci powyżej 10 lat: stosować jedynie po konsultacji z lekarzem, 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.

Skład:

1 tabletką drażowaną zawiera:

substancje czynne: Raphani sativi nigri radices extractum siccum cum carbo medicinalis (wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym) (1:1) 150 mg (DER 18:1, ekstrahent: etanol 85% V/V), Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z ziela karczocha) 47 mg (DER 3:1, ekstrahent: etanol 50% V/V), Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) 40 mg, Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) 15 mg,

substancje pomocnicze: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon, celuloza mikrokryształiczna, substancja barwiąca (tlenek żelaza czarny + dwutlenek tytanu).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostre i przewlekłe zapalenia żołądka i jelit. Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: (nieznana) luźne stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) kolka żółciowa. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcje alergiczne.