Apteka Familia
Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

Stoperan 18kaps.#

cena: 14,93 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	2 mg
Opakowanie	18 kaps.
Postać	kaps.twarde
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Loperamidum

Opis produktu

Wskazania:

Lek jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci powyżej 6 r.ż.

Działanie:

Przeciwbiegunkowe.

Sposób użycia:

- dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: biegunka ostra - pierwsza dawka 2 kapsułki, a następnie 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 8 kapsułek na dobę; biegunka przewlekła: początkowo 1 kapsułka 2 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 4-6 kapsułek na dobę. U dzieci dawkę leku należy dostosować do masy ciała (3 kapsułki/20kg masy ciała).

- dzieci w wieku od 9. do 12. lat: biegunka ostra: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę; biegunka przewlekła: 1 kapsułka

po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę;,

- dzieci w wieku od 6. do 8. lat: biegunka ostra: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 3 kapsułki na dobę; biegunka przewlekła: 1 kapsułka po każdym luźnym wypróżnieniu. Nie należy stosować dawki większej niż 2 kapsułki na dobę.

Skład:

1 kapsułka zawiera: substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian. Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, erytrozyna (E127), żółcień chinolinowa (E104).

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie lekiem należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo rzadko) bóle i zawroty głowy, zmęczenie. Zaburzenia psychiczne: (bardzo rzadko) senność. Zaburzenie żołądka i jelit: (bardzo rzadko) zaparcia, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, ból brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, niedrożność jelit, rozszerzenie okrężnicy (megacolon), w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo rzadko) wysypka, pokrzywka i świąd. Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu Stevens-Johnsona, rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozpływna naskórka. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: pojedyncze przypadki zatrzymania moczu. Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu jest częstymi objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie,

senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku.