

Traumon żel 0,1g/g 100g



cena: 37,68 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,1 g/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	MEDA AKTIEBOLAG
Rejestracja	
Substancja czynna	Etofenamatum

Opis produktu

Wskazania:

Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci.

Działanie:

Przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Sposób użycia:

Nałożyć pasek długości 5-10cm leku Traumon żel na skórę w okolicy objętej bólem, pokrywając nim powierzchnię nieco większą niż obszar objęty bólem i wcierać aż do całkowitego wchłonięcia się leku. Powtarzać 3-4 razy na dobę.

Skład:

Lek zawiera: substancję czynną: etofenamat 100mg/g oraz substancje pomocnicze: karbomer 940, eter makroglu oleinocetylowy (Emulgin M8 Deo), sodu wodorotlenek, alkohol izopropylowy, makrogol 400, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazana:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u kobiet w ciąży; u dzieci, ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Rzadko ($\geq 1/10\ 000$, $< 1/1\ 000$ pacjentów): zaczerwienienie skóry. Bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$ pacjentów, łącznie z pojedynczymi przypadkami): skórne reakcje alergiczne, np. silny świąd, wysypka, rumień, obrzęk, pęcherze. Wszystkie działania niepożądane przemijają zazwyczaj po odstawieniu produktu leczniczego.