

Troxeutin 0,2g 64kaps.



cena: 40,37 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,2 g
Opakowanie	64 kaps. (4x16 szt)
Postać	kaps.twarde
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SP.Z O.O
Rejestracja	
Substancja czynna	o-(beta-Hydroksyethyl)-rutosidea - (Oxerutinum)

Opis produktu

Wskazania:

Leczenie objawowe zaburzeń krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w kończynach dolnych z objawami ciężkości i bólu nóg, kurczów nocnych, żylaków.

Działanie:

Ochronne na naczynia krwionośne i limfatyczne, usprawniające przepływ krwi i limfy, przeciwdziałające pękaniu włosowatych naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Sposób użycia:

Doustnie 3 razy na dobę po 2 kapsułki przez okres 7 - 10 dni. W leczeniu podtrzymującym zaleca się: doustnie 2 razy na dobę po 2 kapsułki przez okres 20 - 30 dni.

Skład:

1 kapsułka zawiera: 200mg o-β-hydroksyetylorutozydów oraz substancje pomocnicze: laktoza,

skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna, laurylosiarczan sodu, erytrozyna (E127), dwutlenek tytanu (E171), zółcień pomarańczowa (E110), żelatyna.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować produktu leczniczego w I trymestrze ciąży.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 2 - 25 st.C.

Działania niepożądane:

Niezbyt często mogą wystąpić: świąd skóry, wysypka, przemijające nudności i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, zaburzenia snu. Zaleca się zmniejszenie dawki lub okresowe odstawienie leku. Tolerancja preparatu jest dobra. Lek może być stosowany przez dłuższy czas. Produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość barwników w otoczce kaps.