

Vigantol krop.doustne 20000j.m./ml 10ml



cena: 17,81 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy	2-3 dni robocze
Dawka	0,5 mg/ml (20 000 IU/ml)
Opakowanie	10 ml (butelka)
Postać	krop.doustne
Producent	MERCK KGAA
Rejestracja	
Substancja czynna	Cholecalciferolum

Opis produktu

Wskazania:

Vigantol witamina D w kroplach stosuje się:

- w zapobieganiu krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
- w zapobieganiu krzywicy u wcześniaków,
- w zapobieganiu schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych,
- w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
- w leczeniu wspomagającym w osteoporozie u dorosłych.

Sposób użycia:

- wcześniaki * od 2 tygodnia życia: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (1000 IU witaminy D3). Po osiągnięciu 40. tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
- noworodki i niemowlęta * (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co

odpowiada 500 IU Witaminy D)

- dorośli, młodzież (w wieku 12 lat i więcej) i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D)
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D).

* - u wcześniaków, noworodków i niemowląt lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

Skład:

1ml (40 kropli) zawiera 500µg cholekalcyferolu (co odpowiada 20 000 IU witaminy D3). Jedna kropla zawiera 12,5µg cholekalcyferolu (co odpowiada 500 IU witaminy D3). Substancje pomocnicze; triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować:

- hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) i(lub) hiperkalcynuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem),
- kamica nerkowa i(lub) ciężka niewydolność nerek,
- rzekoma niedoczynność przytarczyc.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.